

プレミアム2NDカットチモシー（2番刈り）



管理された牧草農場で灌水栽培され、より優れた中からサラブレッド用にセレクトされた『最高級2NDカットチモシー牧草』です。「Leaf Type(葉タイプ)・Stem Type(茎タイプ)」

- **産地** ワシントン州(エレンスバーグ、ベイスン)産
- **播種** 3~4月。チモシーを単播します。
- **刈り取り** 1番刈り後(6月中旬~7月)、再生してきたチモシーを7~8月に刈り取り
- **品質** 色合いは1番刈りより濃いグリーンカラーです。日射条件が悪く、作付け密度が高いと下草の枯れが出て敬遠されます。1番刈りに比べ、茎が柔らかく葉が多いので、非常に嗜好性に長けた牧草です。
- **くん蒸** 輸入チモシーは大麦・小麦と同一地帯で栽培され、日本の稲作に重大な被害をもたらすヘシアンバエが寄生する麦ワラやカモジ草等の混入の可能性が高い為、日米間の植物防疫法でくん蒸が義務付けられています。11月頃から翌年4月頃まで行われる。



USチモシー2番草 栄養成分表					
	原物中	乾物中		原物中	乾物中
水分	9.30%	—	マンガン	87.2mg	96.2mg
乾物	90.70%	—	亜鉛	19.3mg	21.3mg
TDN	54.30%	59.90%	銅	4.5mg	4.9mg
粗蛋白質	9.60%	10.60%	鉄	43.7mg	48.2mg
粗脂肪	2.30%	2.60%	ナトリウム	0.03%	0.03%
粗繊維	54.60%	60.20%	塩素	0.59%	0.65%
粗灰分	7.60%	8.40%	マグネシウム	0.11%	0.12%
カルシウム	0.17%	0.19%	カリウム	1.95%	2.15%
リン	0.16%	0.18%	イオウ	0.09%	0.09%

日本農産工業株式会社調べ